

Registro de convulsiones

Un registro claro es de lo más útil que puedes llevarle a tu veterinario. **Mide cuánto dura cada convulsión, grábala si puedes hacerlo con seguridad y anota qué pasó antes y después.** Una convulsión de más de 5 minutos es una emergencia.

PDF RELLENABLE: ESCRIBE EN LA COMPUTADORA O LA TABLETA, O IMPRÍMELO Y LLÉNALO A MANO.

NOMBRE DEL PERRO

MEDICAMENTO Y DOSIS

VETERINARIO / URGENCIAS

DURANTE Y DESPUÉS DE UNA CONVULSIÓN

- 1

Mide el tiempo desde la primera señal, y grábala si puedes.
- 2

Evita que se caiga o se golpee: aparta muebles y objetos frágiles, y en escaleras quédate debajo de él.
- 3

Las manos lejos de la boca. Los perros no se tragan la lengua y te podría morder fuerte.
- 4

Acércate despacio después. Puede quedar confundido, caminar sin parar o no ver por un rato, y la confusión puede parecer agresión.

CUÁNDO ACTUAR

- Ve ya**

Una convulsión de más de 5 minutos (ve aunque pare en el camino), una segunda antes de recuperarse del todo, o cualquier convulsión tras una posible intoxicación (anticongelante, cebo para babosas, insecticidas, plomo).
- Llama hoy**

Dos o más convulsiones en 24 horas, la primera convulsión de su vida, o una recuperación de más de 24 horas.
- Avísale al veterinario**

Una primera convulsión en un perro de menos de 6 meses o de más de 6 años, u otras señales neurológicas entre convulsiones. Lleva este registro a cada consulta.

REGISTRO DE CONVULSIONES

FECHA Y HORA	DURACIÓN	CÓMO FUE	JUSTO ANTES (SUEÑO, COMIDA, EMOCIÓN)	RECUPERACIÓN	¿VIDEO?

Nunca suspendas ni cambies su medicamento por tu cuenta: dejarlo de golpe puede provocar convulsiones. Anota también medicamentos nuevos, antipulgas o desparasitantes, cambios de dieta y suplementos; tu veterinario querrá verlos junto al registro.

LA VERSIÓN COMPLETA: SEIZURE RESPONSE SERVICE DOG GUIDE (EN INGLÉS) · EN ETSY: NEWDOGCO.ETSY.COM

Fuentes: VCA Animal Hospitals (epilepsia en perros; convulsiones en perros); Cornell Riney Canine Health Center (manejo de convulsiones); declaraciones de consenso del International Veterinary Epilepsy Task Force; Manual Veterinario Merck. La mayoría de las convulsiones generalizadas duran 1–2 minutos (VCA).