

# Recuperación del perro tras una cirugía

Las dos primeras semanas después de una cirugía son sobre todo **reposo, una herida protegida y medicamentos a tiempo**. Sigue primero las indicaciones de alta de tu veterinario; esta hoja reúne las revisiones diarias y te ayuda a distinguir lo normal de lo que amerita una llamada.

PDF RELLENABLE: ESCRIBE EN LA COMPUTADORA O LA TABLETA, O IMPRÍMELO Y LLÉNALO A MANO.

NOMBRE DEL PERRO

CIRUGÍA Y FECHA

TELÉFONO DEL VETERINARIO

TODOS LOS DÍAS

☐ **Revisa la herida dos veces al día.** Una foto te ayuda a comparar.

☐ **Collar isabelino o traje de recuperación** puesto todo el tiempo, no a ratos.

☐ **Salidas al baño solo con correa.** Sin correr, saltar ni jugar brusco (muchas veces 7–14 días).

☐ **Medicamentos tal como se indicaron**, sin saltarse dosis.

☐ **Sin baños ni nadar** hasta que tu veterinario diga que la herida se puede mojar.

☐ **Anota apetito, orina y heces.** Es común esperar 1–2 días para la primera evacuación.

¿NORMAL O LLAMAR?

**Suele ser normal**

Limpia, bordes juntos, un poco rosada; algo de supuración intermitente las primeras 24 horas; somnoliento como un día.

**También llama**

No puede orinar o hace esfuerzo, varios días sin evacuar, más dolor o decaimiento, tos que empeora.

**Llama al veterinario**

Goteo o supuración después de 24 horas; hinchazón, calor, pus, mal olor o herida abierta; puntos arrancados.

**Señales de dolor**

Jadeo en reposo, cuerpo encorvado, inquietud, lamerse un solo lugar, quejidos, comer menos. Llama si el dolor parece aumentar.

| DÍA / FECHA | HERIDA | APETITO | ORINA · HECES | MEDICAMENTOS | NOTAS |
|-------------|--------|---------|---------------|--------------|-------|
|             |        |         |               |              |       |
|             |        |         |               |              |       |
|             |        |         |               |              |       |
|             |        |         |               |              |       |
|             |        |         |               |              |       |
|             |        |         |               |              |       |

**Nunca le des analgésicos para personas** (ibuprofeno, naproxeno, aspirina) salvo que tu veterinario los recete: pueden causar úlceras de estómago y daño al riñón o al hígado. Los puntos o grapas se quitan en la fecha de tu veterinario, por lo general a los 7–14 días.